Hollister™

التعايش مع الشرج الإصطناعي

سلسلة تعليم المرضى

التعـــايش مـــع

الشـــــــــرج

الاصـــطنـــــاعي

ما هو الشرج الاصطناعي:

إن الشرج الاصطناعي عبارة عن فتحة يتم إحداثها جراحياً في القولون - عبر البطن. والغرض من الشرج الاصطناعي هو السماح للبراز بأن يتفادى جزءاً مريضاً أو تالفاً من القولون.

وعندما يكون لدى أي شخص شرج اصطناعي فإن البراز لم يعد يخرج من خلال الشرج. وبدلاً من ذلك ، فإن البراز يخرج من خلال فتحة الشرج الاصطناعي. إن الشرج الاصطناعي ليس لدية عضلة عاصرة ، لذا فإن أي شخص يكون لدية شرج اصطناعي لا يكون لدية تحكم إرادي في حركات التغوط. وعوضاً عن ذلك فإن الشخص يرتدى جيباً للاستعمال مرة واحدة لتجميع البراز. وقد يكون الشرج الاصطناعي مؤقتاً أو دائماً ويعتمد ذلك على السبب الطبي لعمليتك الجراحية.

ولإنشاء شرج اصطناعي فإن الجراح يحضر جزءاً من قولون الشخص عبر الجدار البطني. وهذه الفتحة الجديدة ببطن الشخص تسمى بالفتحة الجراحية. وتسمى البشرة حول الفتحة الجراحية بالبشرة المحيطة بالفتحة الجراحية وتعتبر فتحة كل شخص على حدة فريدة وفتحتك الجراحية ستبدو بأنها مختلفة من فتحة شخص آخر.

لا توجد نهايات أعصاب في الفتحة الجراحية ولذلك فإن الفتحة الجراحية ليست مؤلمة. تكون الفتحة الجراحية دائماً حمراء ورطبه وهى إلى حد ما تشبه داخل الفم. كذلك فإن الفتحة الجراحية قد تنزف بسهولة خاصة إذا تعرضت للضرب أو الاحتكاك. إن هذا النوع من النزيف البسيط المؤقت للفتحة الجراحية يعتبر عادياً. (إذا إستمر النزيف) أو إذا كان البراز الخارج من الفتحة الجراحية دموياً فإن الواجب عليك الاتصال بطبيبك أو ممرضتك للعناية.



الفتحة الجراحية
- ليست مؤلمة
- دائماً حمراء ورطبة
- يمكن أن تنزف بسهولة

ينقسم القولون إلى أربعة أجزاء القولون الصاعد ، القولون المستعرض، القولون النازل والقولون السيني / السجمى. ومع تحرك البراز عبر قولونك فإن المزيد والمزيد من الماء يتم امتصاصه حتى يصير البراز متكوناً بالكامل. وعندما تحدث لك حركة تغوط فإن البراز يذهب من قولونك إلى مستقيمك ومن ثم يخرج من جسمك عبر شرجك. توجد عضلة في شرجك ، تسمى بمعصرة الشرج ، وحتى تتيح لك التحكم عندما تحدث لديك حركة تغوط.



الجهاز الهضمي للإنسان :

عندما تقوم بمضغ طعامك وابتلاعه ، فإن الطعام ينزل عبر مريئك في معدتك وتقوم أحماض وكيماويات المعدة التي تسمى بالإنزيمات بتكسير الطعام حتى يصير مزيجاً سائلاً. ومن معدتك يذهب مزيج الطعام السائل إلى أمعائك الدقيقة.

الأمعاء الدقيقة - يبلغ طولها حوالي ٢٠ قدماً (٦ أمتار) وفيه تحدث غالبية الهضم.

إن الفيتامينات، الأملاح المعدنية، البروتينات ، الدهون ، والكربوهيدرات كلها يتم امتصاصها في جسمك عبر أمعائك الدقيقة - وأي طعام لا يتم امتصاصه في الأمعاء الدقيقة يذهب إلى الأمعاء الغليظة كفضلات سائلة أو براز. كذلك فإن أمعائك الغليظة تسمى بالقولون. ويبلغ طوله عموماً ٦ أقدام (٢ متر). وللقولون وظيفتان رئيسيتان:

(١) امتصاص الماء من برازك.

(٢) ان يحتفظ ببرازك ريثما يحدث لك حركة تغوط.



التعايش مع الشرج الإصطناعي

في كل عام فـــإن الآلاف من الناس تجـري لهـــم جراحـة شـرج اصطناعي. وللبعض تعتبر الجراحة إجراءاً منقذاً للحـــياة. ولآخرين فإن الجراحة تريح من سنين من المعاناة من مرض المصـران. ومهمـا كـان السبب الطبي، ألا أن لكل فرد يكون في سبيله إلى إجـــراء جراحة شـرج اصطناعي تكون لديه العديد من الاستفسارات وموجبات القلق.

ومن ثم فإن هـذا الكتيب يقدمه لك فريق العناية بصحتك. وهـذا الكتيب سيكون امتداداً لمعـلومات أخـرى يـزودك بها طبيبك وممرضة العنـاية.

إن الغرض من هـذا الكتيب هـو الإجـابة على بعض استفساراتك بشـأن جراحة الشرج الاصطناعي ولتبديد بعض ما يثير القلق لديك بشأن العيش بشرج اصطناعي.

اسم ممرضتك للعناية : .....

أرقام الإتصال :.....

.....

.....

الأدويـــــة:

إن أية أدويـــة تتعاطاهـــا سوف تعمـــل بنفس القدر من الكفاءة كما كان الحال من ذي قبل. والعقاقير المقررة بوصفه طبية والفيتامينات والأسبرين (أو بدائل الأسبيرين مثل التايلينول) والأدوية الأخرى سيستمر امتصاصها في جسمك بنفس القدر كما هو الحال قبل إجراء عمليتك الجراحية.

قـد تغير بعض الأدوية لون ، رائحة ، أو قوام برازك. الأدوية التي لا تـكون بـوصفـه طبية مثل مضـادات الحمـوضة ، يمكن أن تسبب إمساكاً أو إسهالاً. يمكن أن تجعل المضـادات الحيـوية بـرازك أرق قـواماً من العـادة ، وحتى قد يسبب إسـهالاً. إذا كـانت لـديك أسئلة بشأن الأدوية التي تتعاطاها ، اسأل طبيبك أو ممرضتك للعناية أو صيدلي محلي.

الإستسقاء القولوني الداخلي:

إن الرحض يمكن أن يكون في بعض الأحيان خياراً لأي شخص يكون لديه شرج اصطناعي نازل أو شرج اصطناعي سيني / سجمي. إن الغرض مـن رحض الشـرج الاصـطنـاعي هـو أن يتسني للشخص أن يكون لديه تحكم على حركة التغوط. يقوم الرحض بتدريب القولون على الإفراغ في وقت منتظم في كل يوم على حده.

إن الرحض يشابه نوعاً ما من رحضة عبر الفتحة الجراحية. ومن المهم جداً لك أن تتعلم الطريقة الفنية للرحض من محترف عناية بالصحة. إذا كنت ترغب في الرحض فإن عليك أن تسأل ممرضتك للعناية عن ذلك.

الملابس :

بعد إجراء عملية جراحة الشرج الاصطناعي فإن العديد من الناس ينتابهم القلق بأن الكيس سيكون مرئياً تحت ملابسهم. وبعض الناس يظنون بأنهم لن يستطيعون ارتداء ملابس عادية ، أو بأنهم سيتعين عليهم ارتداء ملابس كبيرة جداً بالنسبة لهم. أن الحقيقة هي ، أنه يجب أن تكون قادراً على ارتداء نفس النوع من الملابس التي كنت ترتديها قبل إجراء الجراحة لك. كذلك فإن الأكياس في يومنا الحاضر رفيعة جداً ومناسبة ولصيقة جداً بالجسم ومن ثم فإنه لا توجد أي فرص لأي شخص بأن يعرف بأنك ترتدى كيساً - ما لم تخبرهم أنت.

إرشادات تتعلق بنمط حياتك

- عليك اختيار بدله سباحة مظللة بدلاً من بدله بلون واحد.
- بإمكان الرجال أن يرتدوا أربطة جوارب رياضية.
- بإمكان النساء أن يرتدوا بنطلونات ضيقة ومشدات.

العودة إلى العمل والسفر:

كما هو الحال مع أي عملية جراحية، فإنك ستحتاج إلى بعض الوقت للشفاء من هذا النوع من الجراحة يمكن أن يستغرق من ستة إلى ثمانية أسابيع. يجب عليك مراجعة طبيبك قبل العودة للعمل.

إرشادات تتعلق بنمط حياتك

- أحتفظ بمنتجات فتحتك الجراحية معك في الحقيبة التي تحملها معك وليس مع أمتعتك.
- ضغط الهواء في الطائرات لن يؤثر في الكيس.
- أربط حزام المقعد فوق أو تحت فتحتك الجراحية.
- لا تترك منتجات فتحتك الجراحية في سيارة ساخنة فقد تذوب المواد اللاصقة.
- عندما تكون بعيداً لمدد طويلة من الزمن ، فعليك أن تكون على علم أين يتسنى لك الاتصال بممرضة العناية (أنظر صفحة ١٧ لأغراض المساعدة أو لمعلومات إضافية).
- الخطوط الإرشادية العامة للمسافرين لتجنب اضطرابات المعدة أثناء السفر لا تزال تنطبق على الأشخاص الذين لديهم فتحات جراحية.

بعد شفاءك ، يجب أن تكون قادراً للعودة للعمل أو السفر لأي مكان. إن الشرج الاصطناعي يجب ألا يكون قيداً عليك. إن منتجات الشرج الاصطناعي متوفرة من قبل بائعي التجزئة / القطاعي للمنتجات الطبية أو الجراحية في كافة أقطار العالم تقريباً. وبالطبع فإنها تعتبر فكرة جيدة أن تأخذ معك تجهيزاتك الخاصة عندما تسافر وأن تأخذ معك أكثر مما تظن بأنك ستحتاجه.

الإســـهال:

لأي فرد فإن الإسهال يمكن أن يكون بسبب مرض (مثل الزكام) أو لأسباب مختلفة. ومع وجود شرج اصطناعي لديك فإنه لا يزال من الممكن أن تحدث لك إسهال تماماً كما كان الحال قبل إجراء الجراحة لك.

إذا حدث لك إسهال فإن هناك بعض الأطعمة التي بإمكانك تناولها من شأنها أن تساعد في أن يكون برازك غليظ القوام. تجنب الأطعمة والمرطبات التي تسبب البراز السائب.

إرشادات تتعلق بنمط حياتك

- إذا أصبت بإسهال ، عليك زيادة السوائل التي تتناولها.
- إذا كنت تستقي شرجك الاصطناعي ، أوقف الاستسقاء حتى يتوقف الإسهال . بعد توقف الإسهال بإمكانك أن تستأنف جدولك العادي للاستسقاء.
- إذا استمر الإسهال أتصل بممرضتك للعناية أو بطبيبك.
- إن الإسهال الذي يستمر طويلاً جداً قد يسبب الجفاف.

الأطعمة والمرطبات التي قد تجعل برازك غليظ القوام:

عصير التفاح
الموز
زبدة الحليب
الجبن
حلوي الحطمى
الحليب (المغلي)
الشعيرية (أي نوع)
زبده الفول السوداني (كريمية القوام وليس قطع غليظة)
بسكويت العُقدية
الأرز
بودنج التبيوكة
خبز محمص
الزبادي

الأطعمة والمرطبات التي قد تسبب برازاً سائباً:

البيرة أو المشروبات الكحولية الأخرى
قرنبيط بروكولي
الفواكة الطازجة (باستثناء الموز)
عصير الجريب
الفاصوليا الخضراء
البرقوق أو الخوخ أو عصير البرقوق أو الخوخ
الأطعمة المتبلة
السبانخ

الرائحـــــة:

تشكل الرائحة قلقاً رئيسياً للأشخاص الذين يقدمون على أن تجرى لهم جراحة شرج اصطناعي وفي يومنا الحاضر فإن جيوب الشرج الاصطناعي يتم تصنيعها مزودة بغشاء مانع للرائحة الكريهة. ومن ثم فإن الرائحة الكريهة من البراز يتم احتوائها داخل الكيس. إذا كان الكيس نظيفاً وتم استعماله على نحو صائب ، فإنك لابد أن تلاحظ الرائحة الكريهة عندما تقوم بتفريغ أو تغيير جيبك. إذا لاحظت رائحة في أي وقت آخر، عليك فحص غطاء الكيس بخصوص التسرب.

يجب عليك تفريغ الكيس عندما يكون ذلك ضرورياً ومريحاً وللكثير من الناس فإن ذلك يعنى بواقع مرة إلى ثلاث مرات في اليوم. إن قيامك بتفريغ الكيس بانتظام يمكن أن يساعد في تقليص مخاطرة التسريب. كذلك فإن التفريغ المنتظم يمكن أن يساعد في تفادى الانتفاخ من الكيس الذي يكون بالغ الإمتلاء.

وفي بعض الأحيان فإن أطعمة أو أدوية معينة يمكن أن تؤثر في رائحة البراز. إذا كانت الرائحة تثير قلقك، فإن لك أن تتجنب الأطعمة التي تزيد الرائحة. وإذا كانت لديك استفسارات بشأن أدوية تتعاطاها، فعليك طرح تلك الاستفسارات على طبيبك أو على ممرضتك للعناية. (للمزيد من المعلومات، أقرأ الأجزاء بشأن الأغذية صفحة ٨ والأدوية صفحة ١٠ في هذا الكتيب).

الغـــــازات:

إن كمية الغازات التي يكونها جهاز أي شخص تعتمد على الفرد. إذا كانت لديك مشكلة مع الغازات الزائدة قبل جراحتك ، فإن من الأرجح أن تكون لديك نفس المشاكل بعد إجراء الجراحة لك. يمكن أن يكون غاز المستقيم في بعض الأحيان نتيجة ابتلاع هواء. إن شربك لمرطبات غازية، التدخين ، مضغ اللبان ، المضغ مع فتح فمك كلها يمكن أن تزيد من كمية الهواء الذي تبتلعه.
في بعض الأحيان يمكن أن يسبب الغازات من قبل الأطعمة التي تأكلها. إذا كانت الغازات مشكلة لك فإن لك أن تتجنب أطعمة معينة مُكونه للغازات. (لمزيد من المعلومات إقرأ الجزء التالي بشأن الوجبات في هذا الكتيب).

أنواع الشرج الاصطناعي:

يمكن أن يتم عمل شرج اصطناعي في الغالب عند أي موضع على طول القولون. وحيثما سيكون موضع شرجك الاصطناعي فأن ذلك يعتمد على السبب الطبي لعمليتك الجراحية.

يتم عمل الشرج الاصطناعي الصاعد من جزء صاعد من الجزء الصاعد من القولون.

- الخراج : براز سائل أو شبيه بالمعجون
- الكيس : قطعة واحدة قابلة للتصريف ، أو قطعتان قابلتان للتصريف.



الشرج المستعرض : يتم عمله من الجزء المستعرض من القولون.

- الخراج : براز مثل المعجون أو شبه متشكل.
- الكيس : قطعة واحدة قابلة للتصريف أو قطعتان قابلتان للتصريف.



الشرج الاصطناعي النازل : يتم عمله من الجزء النازل من القولون

- الخراج: يكاد يكون برازاً متشكلا بالكامل.
- الكيس : قطعة واحدة قابلة للتصريف
  قطعة واحدة مغلقة
  قطعتان قابلتان للتصريف.
  أو قطعتان مغلقتان



الشرج الاصطناعي السيني / السجمى :

يتم عمله من الجزء السيني / السجمى من القولون.



- الخراج : براز متشكل بالكامل.
- الكيس : قطعة واحدة قابلة للتصريف
  قطعة واحدة مغلقة
  قطعتان قابلتان للتصريف.
  قطعتان مغلقتان. أو
  سدادة للفتحة الجراحية
  (إذا كان يحدث لك غسيل داخل القولون)
  أو (استسقاء قولوني)

ثلاثة أنواع من تكوينات الفتحة الجراحية:



فتحة طرفيه



فتحة لولبية



فتحة منقسمة

الوجبـــات:

بما أن لديك شرجا اصطناعياً لا يعنى بأن الواجب عليك أن تتناول وجبات خاصة. تّذكر بأن الهضم الفعلي للطعام يكاد يكون حدوثه بالكامل في الأمعاء الدقيقة وليس في القولون. وقد يحدث مباشرة بعد عمليتك الجراحية فإن طبيبك قد يقرر لك وجبات خاصة. ومن ناحية أخرى، بعد مدة استشفائك ، فيجب أن تكون قادراً للعودة إلى وجبتك العادية.

إن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب رائحة أو غازات في جهازك. إذا كان ذلك مثاراً للقلق لك ، فإن لك أن تأكل هذه الأطعمة باعتدال.

إرشادات تتعلق بنمط حياتك

- تناول وجبة متوازنة
- كل ببطء وأمضغ طعامك جيداً
- أضف أطعمة تدريجياً لوجبتك لكي تلاحظ مدى ملائمة تلك الأطعمة لجهازك
- إن كل شئ باعتدال يعتبر قاعدة جيدة جديرة بالاتباع

الأطعمة التي قد تزيد الرائحة:

الهليون	البيض
قرنبيط بروكولي	السمك
الملفوف ذو الرؤوس الصغيرة	الثوم
ملفوف	البصل
قرنبيط	بعض التوابل

الأطعمة والمرطبات التي قد تزيد الغازات:

الحبوب	قرنبيط
البيرة	القمح
قرنبيط بروكولي	الخيار
الملفوف ذو الرؤوس الصغيرة	الفطر
ملفوف	الفاصوليا
المرطبات الغازية	السبانخ

الحمام والاستحمام:

مع شرجك الاصطناعي بإمكانك استعمال الدش أو الاستحمام ، تماماً كما كنت تفعل من قبل. إن الصابون والماء لن يلجا في فتحتك الجراحية ولن يؤذيان فتحتك على أي نحو. ويجوز لك أن تختار إما استعمال الدش أو الاستحمام مع وجود أو عدم وجود الكيس والخيار لك. ونظراً لأن بقايا الصابون يمكن في بعض الأحيان أن تتداخل مع جودة التصاق القاعدة بالجلد ، فإن عليك تجنب الصابون الذي يخلف بقايا على بشرتك. قم بإختيار صابون أو منظف يكون خالياً من البقايا / المخلفات.

العناية بالبشرة:

إن من المهم جداً للبشرة حول الفتحة الجراحية (البشرة المحيطة بالفتحة) بأن تظل صحية وخالية من الحساسية. والبشرة حول الفتحة الجراحية يجب أن تبدو تماماً مثل البشرة في بقية أنحاء بطنك.

لمنع حساسية البشرة أو مشاكل البشرة الأخرى فإن الواجب أن يكون لديك قاعدة وكيس بمقاسات صحيحة.

وفي كل وقت تقوم بإزالة القاعدة لبشرتك والكيس، فإن عليك أن تنظر بعناية إلى البشرة المحيطة بالفتحة الجراحية. إذا لاحظت وجود أي ورم، احمرار أو طفح جلدي فقد يكون لديك بشرة مصابة بالحساسية وفي بعض الأحيان - ولكن ليس دائماً - فإن البشرة المصابة بالحساسية تكون مؤلمة. إذا استمرت المشكلة لما يتجاوز تغيرين للكيس ، فعليك الاتصال بممرضتك للعناية.

التمارين والرياضة :

إن الشرح الاصطناعي يجب ألا يمنعك من إجراء التمارين أو من أن تكون نشطاً جسمياً. وبخلاف الرياضات القاسية جداً التي تتطلب احتكاكاً أو رفعا ثقيلاً جداً ، فإنك يجب أن تكون قادراً للاستمتاع بنفس نوع الأنشطة الجسمية التي كنت تستمتع بها قبل عمليتك الجراحية.

إن بمقدور الأشخاص الذين لديهم شروح اصطناعية أن يسبحون، يتزلجون على الماء أو على الجليد، يلعبون الجولف، التنس، كرة الطائرة، أو الكرة اللينة، الحركة بعنف، الإبحار، أو الاهتزاز بعد عملياتهم الجراحية تماماً كما كانوا يعملون في الماضي.

إرشادات تتعلق بنمط حياتك

- قبل أن تسبح ، فأنها فكرة جيدة بأن تفرغ جيبك.
- في أي حوض ساخن أو ساونا أو دوامة ، فإن الماء الساخن قد يفك التصاق جيبك. عليك تفحص التصاق الكيس وعليك تغييره أن صار مفكوكاً.

الجنس والعلاقات الشخصية :

نظراً لأن جراحة الشرح الاصطناعي تعتبر إجراءاً مغيراً للجسم ، فإن العديد من الأشخاص ينتابهم القلق والخوف بشأن الجنس ، وبشأن القبول من قبل الزوج / الزوجة. وبالنسبة للبعض فإنه يعتبر مصدر قلق ويكون كبيراً بشأن كيفية إخبار أي شخص بشأن الشرح الاصطناعي.

إن من المهم تذكر أن العلاقات الشخصية المساندة يمكن أن تكون مصادر رئيسية للشفاء بعد أي نوع من الجراحة. كذلك فإن من المهم أن تخطر زوجتك / زوجك بأن يعلم بأن النشاط الجنسي لن يؤذيك ولن يؤذى فتحتك الجراحية.

إن جراحة الشرح الاصطناعي تؤثر على كلا الزوجين في أي علاقة ، ويجب على كل من الزوجين على حده أن يتواءم - كل على حده بطريقته الخاصة.

إن المفتاح بالطبع ، هو الفهم والتواصل.

إذا كان إنجاب الأطفال يشكل قلقاً لك ، فإنه سيكون من دواعي سعادتك أن تعلم بأنه بعد شفاءك تماماً، فإنه لا يزال من الممكن لأي امرأة لديها فتحة جراحية بأن تنجب أطفالاً. كذلك فإن العديد من الرجال قد صاروا آباءاً بعد أن أجريت لهم جراحة شرج اصطناعي. إذا كانت لديك استفسارات بشأن الحمل، لا ترددي بأن تسألي طبيبك أو ممرضتك للعناية.

إرشادات تتعلق بنمط حياتك

- أفرغ جيبك قبل ممارسة العلاقات الجنسية.
- لن يؤذيك النشاط الجنسي ولن يؤذى فتحتك الجراحية.
- قد تفضل أن ترتدي جيبا صغيرا أو غطاء للفتحة أثناء العملية الجنسية.
- غطاء الكيس يساعد لإخفاء محتويات الكيس.
- أن طوق كمر يمكن أن يخبئ جيبك ويجعله لصيقاً بجسمك.

إذا كان لديك شرج اصطناعي:

إتصل بممرضتك للعناية إذا لاحظت أياً مما يلي:

- حساسية البشرة.
- حدوث تسربات متكررة حول الكيس أو القاعدة.
- النزف الزائد لفتحتك الجراحية.
- وجود دم في برازك.
- حدوث تغيير في لون أو تركيبة برازك.
- حدوث انتفاخ في البشرة حول فتحتك الجراحية.
- إذا ظهر بأن الفتحة الجراحية تزداد طولاً.

إذا كان لديك فتحة جراحية للتفميم اللفائفي:

إتصل بممرضتك للعناية إذا لاحظت أياً مما يلي:

- حساسية البشرة.
- حدوث تسربات متكررة حول الكيس أو القاعدة.
- النزف الزائد لفتحتك الجراحية.
- وجود دم في برازك.
- حدوث تغيير في لون أو تركيبة برازك.
- حدوث انتفاخ في البشرة حول فتحتك الجراحية.
- إذا ظهر بأن الفتحة الجراحية تزداد طولاً.

إذا كان لديك فتحة جراحية بالجهاز البولي :

إتصل بممرضتك للعناية إذا لاحظت أيا مما يلي:

- وجود أي علامة لالتهاب مجرى البول:

بول غامق ، سحابي *حمى*
بول قوى الرائحة *فقدان الشهية*
آلم بالظهر (حيث تقع كليتاك) *اشمئزاز*
استفراغ

- حساسية البشرة.
- حصوات بول على أو حول فتحتك الجراحية.
- حدوث تسريبات متكررة حول الكيس أو القاعدة.
- النتؤات الصغيرة بالبشرة أو الفاقدة للون حول فتحتك الجراحية.
- النزيف المفرط لفتحتك.
- وجود انتفاخ في البشرة حول فتحتك الجراحية.
- إذا ظهر بأن الفتحة الجراحية تزداد طولاً.

أي أسئلة أود طرحها على طبيبي أو ممرضتي:

.....

.....

.....

.....

جوانب دينيـة:

إن العقيدة الإسلامية توجد بها أحكام قطعية يجب إتباعها في الإعداد للصلاة وأثناء أداء الصلوات. وقد أثير التساؤل بشأن ارتداء كيس أثناء الصلاة.

وفقاً لرئيس مجلس الفتاوى بالأزهر الشريف ، السيد/ عبد الله عبد الخالق المشد ، فإن أي شخص لديه فتحة جراحية يعتبر لديه عذراً شرعياً نظراً لأن المريض الذي تكون لديه فتحة جراحية ليس بإمكانه أن يغير الكيس لكل صلاة على حده. فيجوز للمريض في بداية وقت الصلاة أن يقوم بالوضوء و من ثم يصلى بقدر ما يشاء خلال وقت تلك الصلاة. وعند دخول وقت الصلاة الجديدة، فإن الوضوء في الوقت السابق يعتبر باطلاً ومن ثم فإن المريض الذي لديه فتحة جراحية عليه أن يقوم بوضوء جديد لوقت الصلاة الجديدة وهكذا (لكل وقت من أوقات الصلوات الخمس على حده).

المرجع:

جيه. دبليو. بيرييك (الولايات المتحدة) ٢٠٠١
فتاوى بشأن الإعداد للصلاة للمسلمين الذين لديهم فتحات جراحية.

المـــوزع المعتمـــد

Hollister™

For more information:
Toll Free: 0800 002 909 (South Africa - add+27)
www.hollister.com
www.ostomyworld.com
©2001 Hollister S.A.
MEA 002 - Ptbooklet